



Difterite, tetano, pertosse e/o poliomielite (DTP-polio)

Chi dovrebbe vaccinarsi contro difterite, tetano, pertosse e/o poliomielite?

La vaccinazione combinata contro difterite, tetano, pertosse e/o poliomielite (IPV) chiamata anche vaccinazione dTpa-IPV, è un mezzo sicuro ed efficace per proteggersi da queste malattie gravi.

La difterite e la pertosse sono malattie infettive batteriche altamente contagiose. Si trasmettono da una persona all'altra tramite goccioline di secrezioni. Il tetano è causato da batteri che si trovano ovunque, soprattutto nel terreno e nella polvere delle strade. Pertanto, anche una piccola ferita passata inosservata (procurata ad es. quando si lavora in giardino) può portare a malattie con conseguenze molto gravi. La poliomielite può trasmettersi ancora oggi in aree ad alto rischio, attraverso l'acqua potabile contaminata. L'infezione da poliomielite può portare ad una paralisi grave e talvolta permanente.

La vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse e poliomielite viene effettuata fin dai primi mesi di vita. Al fine di garantire una protezione adeguata, è necessario effettuare dei richiami a intervalli regolari. Poiché queste malattie possono comparire a qualsiasi età, la vaccinazione è essenziale anche per gli adulti. Porti in farmacia il libretto delle vaccinazioni e chiedi al farmacista di quali vaccinazioni ha attualmente bisogno.

Perché vaccinarsi contro difterite, tetano, pertosse e/o poliomielite?

La difterite e il tetano possono manifestarsi a qualsiasi età ed avere gravi conseguenze per la salute se il malato non dispone di una protezione vaccinale adeguata. La pertosse, pericolosa per i bambini e fastidiosa per gli adulti, viene spesso trasmessa dai genitori ai bambini. Pertanto, tutte le persone che hanno contatti familiari o lavorativi con neonati di età inferiore ai sei mesi dovrebbero sottoporsi a regolari vaccinazioni di richiamo contro difterite, tetano e pertosse. Queste vaccinazioni sono inoltre raccomandate per le donne ad ogni gravidanza.

La vaccinazione contro la poliomielite fa ancora parte delle vaccinazioni di base raccomandate, poiché il virus responsabile circola ancora in diversi paesi del mondo. In età adulta la vaccinazione contro la poliomielite è richiesta solo se non sono state effettuate sufficienti vaccinazioni durante l'infanzia o se è previsto un viaggio in un'area a rischio.

Quali effetti collaterali ci si può aspettare?

Nei primi giorni dopo la vaccinazione possono verificarsi una reazione locale o sintomi generali come stanchezza e mal di testa. Queste reazioni sono generalmente innocue e temporanee. Reazioni più pronunciate sono estremamente rare.

Vaccinazione in farmacia: sicura e semplice

In vari cantoni della Svizzera le vaccinazioni contro difterite, tetano, pertosse e/o poliomielite possono essere effettuate in modo rapido, semplice e sicuro da farmacisti con una formazione adeguata.

Approfitti dell'offerta della sua farmacia e si faccia vaccinare direttamente sul posto dopo una consultazione, senza fissare un appuntamento.

Consulti la lista delle farmacie che effettuano vaccinazioni sul sito www.vaccinazioneinfarmacia.ch.